



00000000 0000000000 00000000 00000?

இதில் பல வகைகள் இருந்த போதும் 'ஆண்குறி விறைப்படாதல்' குறைபாடு மிக மிக கியமானதாகும்.

உடலுறவின் போது ஆண் உறுப்பு போதியளவு விறைப்படாதது நிற்காதலால் உடலுறவு திருப்தியைக் கொடுக்காத நிலை எனச் சொல்லலாம். இது ஓரிரும்பு ஏற்பட்டால் அதனை பெரிய குறைபாடாகக் கருமுகியிதது. இளைஞர்களில் ஏற்படும்பு பெரும்பாலும் உளம் சார்ந்ததே.

ஆயினும் தொடர்ச்சியாக இது நிகழ்ந்தால் அதனை **Erectile Dysfunction** எனக் கருவார். வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க இது ஏற்படும்புதற்கான சாத்தியம் அதிகமாகும். இது மிகவும் பரவலாகக் காணப்படும் ஒரு பிரச்சனை ஆகும். ஆண்களில் கிட்டத்தட்ட பத்தில் ஒருவருக்கு இது ஏற்படும்புதாகக் கருபபுகிறது. சிலருக்கு லசோகவும் சிலருக்கு மிகக் கடுமையாகவும் என இது பலவறே நிலைகளில் ஏற்படக் கப்டும்.

இருந்தபோதும் மிக கியமான அம்சம் எனவென்றால் 90 சதவிகிதமானவர்கள் அதனை வெளிவிடாமல் மனதில் வைத்துக் கொண்டு துன்புறுகிறார்கள் ஒழிய வைத்திய ஆலோசனை பெறுவதில்லை.

காரணம் என்ன?

1) பலருக்கு (80%) இது ஒரு உடல் சார்ந்த நோயாகும். பெரும்பாலும் வறே நோய்களின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம்.

a. மிக கியமாக இது இரத்தக் குழாய்கள் (நாடி) சார்ந்த நோயாகும். பக்கவாதம், மாறடபபு போன்றவையும் அவ்வாறே இரத்தக் குழாய் நோய்கள்தான்.

b. நீரிழிவு ஒரு மிக கிய காரணியாகும். உண்மையில் 35 சதவிகிதமான நீரிழிவு நோயாளர்களை இப்பிரச்சனை பாதிப்பதாக தரவுகள் கருகுகின்றன.

c. புரஸ்ரடே நோய் மூள்தண்டு நோய் ஆகியவற்றிற்கான சத்திரசிகிச்சையின் பின்விளைவாகவும் இது ஏற்படலாம்.

d. போதபைப் பொருள் பாவனை மற்றொரு மிக கிய காரணமாகும். புகதைதல், மதுபாவனை, ஏனைய போதபைப் பொருள் பாவனைகள் இதனைக் கொண்டுவரும்.

e. ஆண் ஹோர்மோனான டெஸ்டஸுரரோன் குறைபாடு மற்றொரு காரணமாகும்.

2) சிலரில் இது மன உணர்வுகளோடு தொடர்புள்ள பிரச்சனையாகும். உளநெருக்கீட்டு, மனச்சோர்வு போன்ற உளநோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு இது ஏற்படும்புதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகும். பாலுறவு பற்றிய பதற்றம் (Performance Anxiety), பாலுறவு கொள்ளப் போகும் பண்ணுடனான உறவில் உள்ள உரசல் (relationship Failure), Fear of intimacy போன்றவையும் காரணமாகலாம்.

3) வறே நோய்களுக்கு உபயோகிக் கும் மருந்துகளின் பக்கவிளைவாகவும் இக் குறைபாடு ஏற்படலாம். பிரஸுருக்கு உபயோகிக் கும் தயசடை மாத் திரை, மனச்சோர்வுக்கு உபயோகிக் கும் மருந்துகள், தபுக்க மருந்துகள், கபுடலில் அமிலம் சூரப்பதகை குறைபுதற்காக உபயோகிக் கும் சிமிரிடீன் மாத் திரை போன்றவை சில மருந்துகளாகும்.

மருந்து காரணம் எனக் கருதினால் உடனடியாக அதனை நிறுத்தி ஏற்கனவே உள்ள நோயை அதிகரிக்கச் செய்து விடவணேட்டாம். மருத்துவருடன் கலந்து ஆலோசித்து அதற்கான மாற்று மருந்தை உபயோகிக் கவணேட்டும்.

Written by  
Tuesday, 09 December 2008 12:03 -

---



[REDACTED]

<http://mahalima.blogspot.com/2008/12/blog-post.html>