

-□□□□□□□□□□ □.□□□□□□□□□□□□ -

மழைக்காலத்தில் நாம் கண்டு பிடிக்கும் இன்னொரு நோய் டெங்கு காய்ச்சல். அறுபதுகளின் துவக்கத்தில் 'பிங்கி' ஜூரம் என அறிமுகமான இந்நோய் வந்த சீ சனில்தான் "ஸ்டவ் ஜோசியம்" என்பதும் அறிமுகமானது. 'பிங்கி' என்ற பெயரால் பல நகைச்சுவைத் துணுக்குகள் உருவாயின. ஆனால், அதன் சரியான பெயர் 'டெங்கு' என்பதே.

இந்நோய் ஏற்படக் காரணமாக உள்ளது டெங்கு நுண்ணியே. (நுண்ணி என்பது வரைஸ்தாங்க.... தமிழ் மொழி பெயர்ப்பாளர்கள் நுண்கிருமி என்றால் பாக்டீரியா, அதிநுண்கிருமி என்பது வரைஸ் அதாவது நுண்ணி என்கிறார்கள்)

இவை ஊன்நீர் வகைகளாகப் (Serotypes) பிரித்தால் நான்கு வகைப்படும். அதில் என்ன விசேஷம் என்கிறீர்கள்? அதைப் பிறகு சொல்கிறேன். இவை வயது, பால், இனம் ஆகிய வேறுபாடுபார்க்காமல் எல்லோரையும் ஒன்றாகத் தாக்கும்.

இவற்றைப் பரப்பும் கொசுக்களை 'ஈடஸ் ஈஜிப்டை' என்கிறார்கள். இவை பகல் நேரத்தில் கடிப்பவை. அதனால் நமக்குத் தெரியும். மழைநீரில் அல்லது குளிர்சாதனப் பெட்டி (ரஃபிரிஜரேட்டர்), ஏ.சி ஆகியவற்றில் தங்கும் சிறிதளவு நீரில் கடி கொசுக்கள் முட்டையிட்டுப் பெருகிவிடும். நகர்ப்புறங்களில் சிறுபாத் திரங்களில் இவை பெருகி, நோயைப் பரப்புகின்றன.

சாதாரணமாக, மருத்துவர்களிடம் ஜூரம் என்று போனால் மழைக்காலத்தில் "இதெல்லாம் வரைஸ் ஃபீவர் (viral fever)" என்பார்கள். "அதுக்குப் போய் டெஸ்ட்" எல்லாம் பண்ண வேண்டாம்.... போய் மாத் திரை சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்கள்!" என்பார்கள்

அந்த 'வரைஸ் ஃபீவர்' தான் டெங்கு. பொதுவாக ஒரு நாள் காய்ச்சலுக்கே, என்ன சோதனை செய்யலாம் என வரமறைகளை உள்ளன. நம் ஊரில் "எதுக்கும் எல்லாம் பாத் துடலாமே, டாக்டர்" என்று நோயாளிகள் தாமதம் மூடிவா செய்வது தவறு.

மூதல் நாள் காய்ச்சலில் ஒரே ஒரு சோதனை போதும். (உச்சி மூதல் பாதம் வரை மருத்துவச் சோதித்தாலே பல முறை காரணம் புரியலாம்). குளிர் அல்லது கடுமையான தலைவலி ஏற்பட்டால் மலேரியா உள்ளதா எனச் சோதிக்கலாம். அது ஒன்று மட்டுமே 'பாசிடிவ்' ஆக இருக்கக் கூடும்.

டெங்குதான் என உறுதி செய்வது, அவசியமற்றது. அதற்கென பணம் செலவழிப்பது வீணம். ஏனெனில், டெங்கு காய்ச்சலுக்கென தனிப்பட்ட மருந்துகள் ஏதும் கிடையாது. வறும் பக்கபலம் தரும் சிகிச்சை மட்டுமே போதும். மலேயம் 15 வயதுக்குட்பட்டோருக்கு மட்டுமே - அதிலும் 5% க்கும் குறைவானவர்களுக்கு மட்டுமே உயிருக்குத் தீங்கு ஏற்படும் அளவு பாதிப்பு ஏற்படலாம்.

□□□□□□ □□□□□□□□ :

Written by

Wednesday, 09 July 2008 12:28 -

1) நோய்த் தடும்பாற்றல் இல்லாதவர்களிடம் ஏற்படுவதை (classic dengue) “முறையான டெங்கு” என்கிறார்கள். இந்நோய் வளரிநாட்பிலிருந்து நம் நாட்டிற்கு வந்து தங்கும் இளவயதினரையும் குழந்தைகளையும் தாக்குவது. உடலில் நுண்ணிபுகுந்து 5_8 நாட்கள் சும்மா இருந்து, பிறகு கண்ணீர் க்கசிவு, தடிமன் என வலைகாட்டும். இதற்குச் சில மணி நேரங்கள் கழித்து திடீர் ரென உடம்பை முறிக்கும் வலி, கண்களின் பின்புறத்தில் வலி, பொறுக்க முடியாத தலவைலி மற்றும் கால், கை மட்டிகளில் வலி ஆகியன ஏற்படும்.

உடல் அசைவினால் தலவைலி கட்டும். சிலருக்கு வளிச்சத்தையே பார்க்க முடியாத அளவு கண்கள் கச்சலாம். உடல் நடுக்கமும் குளிரும் சற்று தாமதமாக வரலாம். இவதை தவிர, திக்கம் வராமலும், பசி இன்றி வாய் கசந்து போய், உடல் பலவீனம் அடந்தது அவதிப்படவும் நேரம். கால் வாசி பரேக்குத் தொண்டையிலும், மிக்கிலும் அழற்சி ஏற்படும்.

0000000000 000000 டெங்கு காய்ச்சலின்போது இருமல் மட்டும் வருவதே இல்லை.

மருத்துவச் சோதனையின் போது, கண்களோளங்களதைத் தொட்டால் வலி ஏற்படுவது தெரியும். உடலில் ஆங்காங்கே நிணநீர் முண்டுகள் வீக்கமுற்றுக் காணப்படும்.

பாதி பரேக்கு, நாக்கின் பின்புறம் சிறிய வரேக்கூறு போன்ற குமிழ்கள் ஏற்படும். நாக்கின் மலே மாவு போன்ற கோழைப் பதிந்திருக்கும். மார்பிலும், கரங்களின் உட்பகுதிகளிலும் தலை சிவந்து காணப்பட்டாலும், இவை சில நாட்களில் மறைந்து விடும். அதன்பிறகு, தடித்த அல்லது சிறு கொப்பளங்களோடு தலை சிவக்கலாம். இவை 3_5 நாட்களில் தோன்றி, உடல் முழுவதும் பரவலாம்.

2_3 நாட்களில் காய்ச்சல் குறைந்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிடக் கட்டும். மற்ற நோய்க்குறிகள் அனதையும் மறைந்து போய் விடும்.

ஆனால், அனதையும் 2_3 நாட்களில் மறுபடியும் வந்து விடும்.

இது டெங்கு காய்ச்சலின் தனிப்பட்ட குணநலன் ஆகும்.

அதிர்ஷ்டவசமாக, இத்தகைய classic dengue அதிகம் காணப்படுவதில்லை. நோய்க்குப் பிறகு, பல வாரங்களாக உடல் சரேவு நீடிகும்.

2) இரண்டாவது வகை, சற்றுக் கடுமையான குறைந்த நோய் வகையாகும். இதில் காய்ச்சல், பசியின்மை தலவைலி மற்றும் உடல் வலி ஆகியன இருக்கும். லசோன தலை சிவத்தல் காணப்படும். நிணநீர் முண்டுகள் பாதிப்படவைதில்லை. 3 நாட்களில் உடல் முழுவதும் தறிவிடும். (நம் ஊரில் காணும் ‘வரைஸ் ஃபீவர்’ இந்த வகையைச் சரேந்ததுதான்).

3) இவற்றையெல்லாம் விட அச்சுறுத்தும் ஒன்று ‘டெங்கு குறுதிக் கசிவு காய்ச்சல்’ (dengue hemorrhagic fever) எனப்படும் மின்றாவது வகையாகும்.

இதைப் பார்த்துதான் நாம் மிரண்டு போகிறோம். (குண்ணீர் ப்பாம்புகளகைக் கட்ட நாகப் பாம்பு என அடித்துக் கொல்வதும் அலறி ஓடுவதும் போல்தான் இது).

Written by
Wednesday, 09 July 2008 12:28 -

2) □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ இது குறையும் போது, ரத்தம் சலுத்த வணைபி இருக்கலாம்.

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ டெங்குவைக்கென தடுப்பி சிகள் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் மறையுள்ளபட்டு வருகின்றன. இதுவரை வறற்றி கிட்டவில்லை.

நிச்சயமான ஓரே தடுப்புமுறை, கொசுக்களை ஒழிக்கும் முறையே. மழைநீர் ரையும், வீட்டுகளில் தடுக்கும் நீர் ரையும் அவ்வப்போது ஒழிப்பது மட்டுமே.

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ ஒருமுறை டெங்குவினால் பாதிப்புற்ற பிறகு, தடுப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். ஆனால், அடுத்த முறை 4 ஊன்நீர் வகைகளில் வறையொரு வகை, டெங்கு நுண்ணி தாக்கும் போது, உடற்காப்பு மலம் விளைவிக் கும் சயல்களால் மட்டுமே பெரும் தீங்குகள் ஏற்படும்.

அதாவது, நம்மகை காப்பதற்கென்று உள்ள காவல்துறை, வீட்டில் திருடன் நுழைந்ததற்காக வீட்டையே கொளுத்துவது போன்ற விளைவுகள் ஏற்படும். இந்நிலை பெரும்பாலும் உடல் பலம் குறைவான குழந்தைகளில் _ அதாவது நோஞ்சான்களிடம் _ ஏற்படுவதில்லை. நல்ல திடகாத்திரமான குழந்தைகளே பாதிப்புறுகின்றன. எனவே, நடுத்தர மற்றும் உயர்மட்ட வசதி கொண்ட குடும்பத்தினர் 'டெங்கு' என்றால் அலறுவது நியாயம்தான்! ஆனால், கொசுக்களை ஒழிப்பது நாமும் பங்கறேக வணைபிய ஒரு பொது நல சேவை என்பதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

சீனாவில் மாசே துங் ஆட்சி துவங்கியபோது கொசுக்கள், பிச்சிகள், எலிகள் இவற்றைக் கொல்வது நம் தலையாய கடமை என்றவாடன, மக்கள் வளமுத்து வாங்கியதில், 'சுற்றுச்சூழல் சமநிலை இழப்பே (Ecological imbalance) வந்து விட்டது என்கிறார்கள். அந்த அளவு இல்லா விட்டாலும், கொஞ்சமாவது நாம் சயலப்படலாம்... என்ன சார், சொல்லீங்க?...

<http://maruththuvam.blogspot.com/search/label/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D>